



Główny Inspektorat
Weterynarii

A logo with text on it

AI-generated content may be incorrect.

ASF wspólne działanie, wspólna odpowiedzialność



Afrykański pomór świń (*African swine fever* - ASF) to groźna, zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa świń domowych, świniodzików oraz dzików.

W przypadku wystąpienia ASF w stadzie śmiertelność zwierząt sięga nawet do 100%.

! Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie ASF.

Objawy kliniczne ASF:

nagłe padnięcia świń, gorączka, wybroczyny na powłokach ciała, sinica skóry uszu, brzucha oraz boków ciała, duszność, biegunka (często z domieszką krwi), wymioty, ronienia u macior prośnych.

! W przypadku zaobserwowania nietypowych objawów jest obowiązek natychmiastowego zgłoszenia podejrzania właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii.





§

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

PAMIĘTAJ !!!

- utrzymuj świnie w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach
- zabezpieczaj budynek przed dostępem innych zwierząt
- przed wejściami i wyjściami do i z pomieszczeń używaj urządzeń zapewniających skuteczną dezynfekcję lub wyłóż maty dezynfekcyjne
- przed wejściem i wyjściem oraz wjazdem i wyjazdem z gospodarstwa oraz wybiegu używaj urządzeń zapewniających skuteczną dezynfekcję (niecki dezynfekcyjne lub maty dezynfekcyjne)
- karm świnie paszą zabezpieczoną przed dostępem innych zwierząt
- myj i odkażaj ręce oraz obuwie
- używaj dedykowanej do prac tylko przy świniach odzieży oraz obuwia roboczego
- myj i odkażaj narzędzia oraz sprzęt do obsługi świń minimum raz dziennie
- zwalczaj gryzonie

STOSUJ ZAKAZY !!!

- karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącym z obszarów objętych ograniczeniami II, III (chyba że zastosowano obróbkę w celu unieszkodliwienia ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików przez co najmniej 30 dni)
- wykorzystywania słomy na ściólkę pochodzącej z obszarów objętych ograniczeniami II i III (chyba że zastosowano obróbkę w celu unieszkodliwienia ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików przez co najmniej 90 dni)
- obsługi świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu lub odłowię zwierząt łownych
- wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, zwłok, tusz, części tusz, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem ASF
- wchodzenia osobom postronnym do budynków, w których są utrzymywane świnie
- pożyczania sprzętu do obsługi świń do innych gospodarstw